

COVID-19 백신: 알아야 할 사항

백신 접종을 어디서 받을 수 있나요?



어떻게 예약하나요?



 담당 의료서비스 제공자	담당 제공자에게 전화 또는 온라인 예약
 지역사회 보건소	웹사이트 방문: vaccinelocator.doh.wa.gov/
 지역 약국	또는 1-800-525-0127번으로 전화 후 # 버튼을 누르세요. 통역 서비스가 지원됩니다.
 임시 또는 찾아가는 진료소	진료소는 다양합니다. 친구나 지역사회 구성원들로부터 또는 소셜 미디어에서 진료소에 대해 듣게 될 수 있습니다. 등록 방법을 물어보세요.

백신 접종 시 무엇을 지참해야 하나요?

대형 백신 접종 진료소 방문 시, 워싱턴주 거주 또는 근로 증명 확인서를 지참해야 할 수 있습니다.

다음은 요청할 수 있지만 반드시 제시할 필요는 없습니다.

- 신분증
- 보험 카드
- 사회보장번호



백신 접종비는 얼마인가요?

무료로 백신을 접종받게 됩니다. 비용이 청구되거나 청구서를 받지 않습니다.



2차 접종이 필요한가요?



일부 백신은 2-3회 접종용입니다. 백신 접종 완료 후 최대의 예방 효과가 나타나려면 약 2주가 필요합니다. 일부는 1-2회의 부스터샷 접종이 필요할 수 있습니다.

자세한 사항은 COVID-19 백신 부스터샷 접종을 참조해 주십시오.

Pfizer-BioNTech	생후 6개월~4세: 3회 접종, 1차 접종 후 21일, 2차 접종 후 56일 5세 이상: 2회 접종, 21일 간격
Moderna	생후 6개월 이상: 2회 접종, 21일 간격
Novavax	12세 이상: 2회 접종, 21일 간격
Johnson & Johnson	18세 이상: 1회



미국 시민권자만 백신을 맞을 수 있는 것은 아닙니다. 접종소에서는 체류 신분제에 대해 묻지 않습니다.

개인 정보는 공중 보건 목적으로만 사용됩니다.

자세한 정보 확인 방법

방문: COVIDVaccineWA.org 또는 DOH.WA.GOV/Coronavirus

전화: 1-800-525-0127번으로 전화 후 # 버튼을 누르세요. 통역 서비스가 지원됩니다.



CovidVaccineWA.org

어떤 부작용이 있을까요?

부작용을 경험할 수 있습니다. 부작용은 보통 1-2일 지속됩니다.

전신:

- 피로감
- 두통
- 근육통
- 오한
- 발열
- 메스꺼움



주사를 맞은 팔:

- 통증
- 발적
- 부어오름



2회 접종을 하는 백신의 경우 2차 접종 후 부작용이 심해질 수 있습니다.

알레르기 반응이 나타나면 911에 전화하세요. V-safe에 등록하여 부작용을 신고하세요: vsafe.cdc.gov

특정 백신이 다른 백신보다 효과가 우수하나요?

단일접종의 Johnson & Johnson(J&J) 백신 대신 mRNA COVID-19 백신(Pfizer-BioNTech 또는 Moderna)을 권장합니다.

그래도 J&J 백신을 접종하겠다 하시면 여전히 접종받으실 수 있습니다. Novavax는 다른 선택안을 선호하는 경우 mRNA 백신의 대안으로 이용할 수도 있습니다. 백신 선택안에 대해 의료제공자와 상담해 주십시오.



COVID-19 백신은 어떤 식으로 작용하나요?




COVID-19 백신은 감염병에 대한 방어력을 구축하여 질병에 걸리지 않도록 신체를 단련시킵니다.

백신은 안전한가요?

예, 그렇습니다. 모든 백신은 수만 명의 사람을 대상으로 테스트했습니다.

백신은 다양한 인종의 사람과 비만, 당뇨병, 심장병, 간 질환 및 HIV와 같은 건강 상태를 가진 사람들에게 안전하다고 입증되었습니다.



Department of Health(보건부)는 안전성에 문제가 없도록 정기적으로 안전 보고서를 확인합니다.

왜 백신 접종을 받아야 하나요?

백신을 접종하면 직장에서 안전하게 생활하고 친구 및 가족과 다시 어울릴 수 있습니다.

COVID-19으로 인해 중증 질환에 걸리거나 입원하거나 사망할 가능성이 훨씬 적어집니다.

